


IPRODIONE[®]



Grupo
Fungicida

IPRODIONE.- Fungicida sistémico, protectante y curativo del grupo de las dicarboxamidas, formulado como Polvo Mojable (PM) que contiene 500 gr / Kg de Iprodione, utilizado para combate de enfermedades fungosas causadas por patógenos de diferentes familias.

Composición.

Formulación: Polvo Mojable (PM)
Olor: Agradable
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición garantizada:

Iprodione	500 g / Kg
-----------	------------

Modo de acción

IPRODIONE.- Actúa como un fungicida sistémico que inhibe la germinación de las esporas y crecimiento micleal de los hongos.

Aplicación

IPRODIONE.- Puede aplicarse en varios cultivos, para prevenir y curar enfermedades como botrytis, alternaria, fusarium, etc.

Modo de empleo. Dosis.

Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS Kg/ha.	FRECUENCIA DE APLICACION
ORNAMENTALES Y FLORES	<i>Alternaria</i> spp., Mancha foliar <i>Rhizoctonia</i> spp., Pudrición del tallo. <i>Botrytis cinerea</i> , Moho gris <i>Sclerotinia</i> spp., Podedumbre	1.5 - 2,0 L/ha 0.75 - 100 g x 100 L de agua.	Aplicarse cada 10-15 días durante condiciones favorables de la enfermedad. Usar la dosis mínima en invernaderos.
LECHUGA <i>Lactuca sativa</i> CEBOLLA-AJO <i>Allium cepa</i> TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i> MELON <i>Cucumis melo</i>	<i>Alternaria porri</i> , Mancha de la hoja <i>Sclerotinia</i> spp., Podedumbre. <i>Rhizoctonia</i> spp., Pudrición del tallo. <i>Sclerotium rolfsii</i> , Podedumbre. <i>Phoma</i> spp, Cáncer de rama y tallo.	1.0 - 2.0 L/ha	Aplicarse desde el comienzo de la floración, cuando sea necesario repitase los tratamientos cada 10-15 días. En Tomate tratar desde la aparición del 2 ^{do} ramillete floral.
DURAZNOS <i>Prunus persica</i> ALMENDROS- CEREZOS- CIRULELOS	<i>Monilia laxa</i> , Lancha de flores <i>Botrytis cinerea</i> , Moho gris	1.5 - 2,0 L/ha 0.75 - 100 g x 100 L de agua.	Aplicar en floración, comenzando desde botón floral. Si las condiciones son favorables a la enfermedad aplicar nuevamente en plena flor y caída de pétalos. Usar 1500-2000 L de agua x ha
MANZANOS <i>Malus domestica</i> PERALES <i>Pyrus communis</i>	<i>Alternaria</i> spp., Mancha foliar <i>Botrytis cinerea</i> , Lancha de flores	1.5 - 2,0 L/ha 0.75 - 100 g x 100 L de agua.	Aplicar preventivamente cuando se den la condiciones de desarrollo de la enfermedad.
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	<i>Rhizoctonia solani</i> , Costra negra	1 L x 1000 kg de tubérculo de semilla	Tratar la semilla antes de la siembra.
FRESA/FRUTILLA <i>Fragaria</i> spp.	<i>Botrytis cinerea</i> , Pudrición del fruto <i>Mycosphaerella fragariae</i> , Mancha de la hoja	1.5 - 2,0 L/ha 0.75 - 100 g x 100 L de agua.	Aplicar con 2, 4 flores abiertas, con 50% de floración y a fines de floración y/o cada vez que existan condiciones favorables a la enfermedad.
REMOLACHA <i>Beta vulgaris</i>	<i>Phoma</i> spp, Cáncer de rama y tallo.	300 - 500 g x 100 kg de semilla	Tratamiento a la semilla antes de la siembra.

Compatibilidad

IPRODIONE.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna. Para óptimos resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 4,5-5,5; recomendamos aplicar pH Ned.

Fitotoxicidad

Categoría toxicológica IV

Franja Verde, Producto que normalmente no presenta riesgos bajo condiciones normales de uso.

Presentación

Envase plástico de 100 gr - 200 gr - 500 gr.

Almacenaje y manipulación

Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones

Para más detalles sobre **IPRODIONE** visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nuestro servicio al cliente PBX: 042 110025 Telf: 04 6026497 email: ventas@nederagro.com
 Guayaquil - Ecuador.